

Bekæmpelses metoder

Varde Kommune kan anbefale en række effektive metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Små bestande er det mest effektivt at rodstikke, mens afgræsning eller slåning er bedre til store arealer. Sprøjtning kan være effektivt, men kan generelt ikke anbefales, da kæmpe-bjørnekloen ofte vokser i følsomme naturområder, som kan tage skade af sprøjtemidler. For alle bekæmpelsesmetoderne gælder at jo tidligere man kommer i gang i foråret, jo nemmere går bekæmpelsen.

Vejledning til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Metode/ Bestandsstørrelse	0-20 stk.	21-100 stk.	100 <
Manuel: Rodstikning med spade 5 til 10 cm under jorden	Meget effektiv dog undtaget på meget blød bund, starttidspunkt marts - april og gentages mindst 2-3 gange om året.	Effektiv, men tidskrævende, starttidspunkt marts - april og gentages mindst 2-3 gange om året.	Effektiv, men meget tidskrævende, starttidspunkt marts - april og gentages mindst 2-3 gange om året.
Manuel/maskinel slåning	Effektiv, start april-maj, gentages 3-4 gange i løbet af sommeren, ingen planter må få lov til at blomstre.	Meget effektiv, start april-maj, gentages 3-4 gange i løbet af sommeren, ingen planter må få lov til at blomstre.	Effektiv evt. i kombination med græsning, start april-maj, gentages 3-4 gange i løbet af sommeren, ingen planter må få lov til at blomstre.
Anvendelse af pesticider	Anvend kun pesticider, som er godkendt til formålet, start april-maj	Anvend kun pesticider, som er godkendt til formålet, start april-maj	Anvend kun pesticider, som er godkendt til formålet, start april-maj
Jordbehandling/genopdyrkning	Effektiv, men kan ikke anvendes på alle arealer	Effektiv, men kan ikke anvendes på alle arealer	Effektiv, men kan ikke anvendes på alle arealer
Afgræsning	Effektiv, men tidskrævende, start april-maj, dagligt tilsyn med dyrene.	Effektiv, men tidskrævende, start april-maj, dagligt tilsyn med dyrene.	Meget effektiv, start april-maj, dagligt tilsyn med dyrene.

