

Forvekslingsmuligheder

Der er 4 arter i Vestjylland, som kan forveksles med den invasive kæmpe-bjørneklo. Disse arter vokser i de samme naturtyper, som kæmpe-bjørneklo, men de er alle hjemmehørende og bør derfor ikke bekæmpes.

Arterne er:

- Almindelig bjørneklo (*Heracleum sphondylium*)
- Standkvan (*Angelica archangelica*), i folkemund også kaldet Kvan
- Angelik (*Angelica sylvestris*), i folkemund også kaldet Kvan
- Kål tidsel (*Cirsium oleraceum*), forvekslingsmulighed er størst tidligst på året.

Plante	Kæmpe-bjørneklo	Alm. bjørneklo	Strandkvan	Angelik	Kål tidsel
Højde	2-4 meter	0,8-2 meter	1-2 meter	0,8-2 meter	0,5-1,5 meter
Bladform	Oftest tredelt. Bladrandene er dybt fligede og groft savtakkede	Oftest tredelt. Bladrandene er fligede og savtakkede. Blade håret på undersiden.	Hvert blad delt i mange små blade med fine takker	Hvert blad delt i mange små blade med fine takker.	Bladrandene er savtakket, med tornet rand
Stængel	Øverst dun håret. Nederst groft furet, røde pletter og grove og stive hår spredt på stænglen	Stængel med grove og tætsiddende hård, stængel uden røde pletter	Glat, svagt furet, grøn til rødlig anløben	Glat, dun håret foroven, blådugget, ofte purpurfarvet stængel	Stængel næsten glat og lysegrøn. Evt. få torne
Blomst	Hvide blomster	Skærm med hvide blomster og med store randblomster	Grønne blomster. Skærm næsten kugleformet	Hvide-svagt rosa blomster i skærm	Bleg gule blomster i kurv
Voksested	Over alt	Langs fugtige grøfter, baneterræn eller skovbryn.	Langs søer, vandløb, i rørsumpe og på strandenge	Langs søer, vandløb, i rørsumpe og på strandenge	Langs fugtige grøfter, vandløb og på våde enge

Angelik (Foto Connie Madsen 2011)



Almindelig Bjørneklo (Foto Connie Madsen 2011)



Kål tidseel (Foto Connie Madsen 2011)

