

Besigtigelsesnotat

Arealet blev besigtiget af mig selv og Mette B. Johnsen. Jette Beck deltog i besigtigelse af mark 2-0. Besigtigelsen blev gennemført med henblik på at afgøre arealets naturtilstand og potentiale.

Mark 2-0

Arealet er hestegræsset og opdelt i flere mindre fenner. Generelt fremstår arealet kulturpåvirket. Jette Beck oplyste, at det tidligere var tilladt at tilskuds fodre på arealer, der var omfattet af MVJ-aftaler. Hun fortalte også, at opstemningerne, der skal holde vandstanden i området ligger et stykke syd for denne mark.

Det nordvestlige hjørne af marken er ikke § 3-registreret. Det vurderes umiddelbart på baggrund af terræn og vegetation, at afgrænsningen er korrekt. Det øverste hjørne fremstår temmelig tørt uden indslag af fugtigbundsarter bortset fra enkelte lav ranunkel. Arter som knæbøjet rævehale og kryb-hvene er helt fraværende. Langt hovedparten af mark 2-0 ligger lavere og størstedelen er helt domineret af knæbøjet rævehale og kryb-hvene med indslag af fløjlsgræs, mose-bunke, almindelig kvik og hvidkløver. Arealet er tydeligvis periodevis oversvømmet, men der blev ikke registreret egentlig strandengsvegetation eller vegetation præget af fremsivende grundvand, og der vurderes ikke at være potentiale for udvikling af habitatnaturtyper som rigkær eller strandeng indenfor en lang årrække.

Arealet vurderes at være for tørt og kulturpåvirket til at kunne have værdi for fuglearter på udpegningsgrundlaget. Blåhals vil muligvis være knyttet til tagrørsbræmmer langs kanten af engen.



Figur 1. Mark 2-0 set fra vest mod øst.

Mark 3-0 og 3-1

De to marker ligger ved siden af hinanden op til Varde Å. Begge arealer er ret ensformige, græsdominerede og artsfattige. De er præget af mange års slæt-drift, evt. med eftergræsning (begge arealer er hegnede). Arealerne rummer mange lave partier med stor dominans af knæbøjet rævehale og kryb-hvene og især langs grøfterne findes - i de lavere partier - en del tagrør og stedvis mose-bunke, men langs grøfterne findes en tør levée med arter som fandens mælkebøtte, ager-tidsel og vild kørvel. Nogle partier domineres af almindelig kvik og rød svingel er almindelig på arealerne. I en enkelt plet i den nordlige del af mark 3-1 vokser en bestand af strand-trehage, men samtlige øvrige arter på arealet er lige så karakteristiske for enge, der ikke er saltpåvirkede. Arealet er § 3-registreret som strandeng, men det er ikke af Miljøstyrelsen kortlagt som habitatnaturtypen (1330) strandeng, og eftersom arealet har været drevet uden gødsning i 20 år, vurderes det ikke, at arealet med den nuværende drift vil kunne udvikle sig nærmere mod habitatnaturtypen 1330 strandeng indenfor en overskuelig fremtid. Arealet vil formodentlig med en ændret afvanding og ekstensiv afgræsning kunne udvikle sig mod strandeng med et mere betydeligt indslag af strandengsarter i lavere partier. Arealet vurderes generelt at være for tørt og ensformigt til at have væsentlig værdi som levested for fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet eller for eller ynglende engfugle i det hele taget. Dog vurderes tagrørsbræmmen langs grøfterne, der omgiver engene at være potentiel ynglelokalitet for blåhals.



Figur 2. Mark 3-0 er ensformig med mange lave partier domineret af kryb-hvene og knæbøjet rævehale.